

## Précautions PROFESSIONNEL Auprès de patient ayant des soins AEROSOLISANTS

### Organisation des soins

Habituelle

### Hygiène des mains



Priorité aux solutions hydro alcooliques :

- Avant et après tout soin,
- Entre 2 patients,
- Entre 2 activités,
- Après le retrait des gants

### Masque

#### Masque chirurgical



1 masque pour une durée maximale de 4h  
Chez tous les patients concernés

#### Masque FFP2



**Pour les infirmiers/kinés :**  
**Uniquement** pour :

- **Les actes invasifs au niveau respiratoire :**  
soins de trachéostomie, aspiration endotrachéale,  
aérosol, pleurX ou kiné respiratoire
- **La détersion de plaie** avec Jetox

**Pour tous les professionnels pendant les soins  
dans les 2 heures qui suivent :**

Aérosol, VNI O<sub>2</sub>>6L mn avec masque à haute  
concentration, MEOPA

A éliminer dans les **DASRI**

### Equipement de protection individuelle selon précautions « standard »

**Surblouse +/-tablier** étanche **si** soins mouillants ou risque de projection

**Gants et lunettes de protection, si** risque de contact avec liquide biologique lors des soins dont :

**Les actes invasifs au niveau respiratoire :**  
soins de trachéostomie, aspiration endotrachéale, pleurX ou kiné respiratoire  
**La détersion de plaie avec Jetox**